

Priprava zemlje za zasaditev

Projektantski koncept ureditve vrta je zasnovan tako, da vzdrževalnih del ni veliko, so enostavna oz. so strokovno nezahtevna.

Za čim boljšo rast in razvoj nasada je zelo pomembno, da se zemljišče, predvideno za ozelenitev, pripravi kvalitetno.

Površine predvidene za ozelenitev je najprej potrebno očistiti od gradbenih ostankov, podreti in odstraniti obstoječo drevnino in grmičevje, ki ni predvideno v novem nasadu. Potrebno je poskrbeti za dobro drenažo. Površine, ki jih bomo pozneje zasadili, se najprej frezajo, zrahljajo in se zatem navozi manjkajoča zemlja.

Za grobo oblikovanje zemljišča uporabimo mrtvico (spodnja plast tal, ki leži pod živico) katera se prihrani ob izkopu za objekt. Iz zemlja se odstrani kamenje, gradbeni odpadki ter korenine trajnih plevelov. V zemljo se hkrati vkoplje gnoj, kompost, da bi izboljšali sestavo in povečali delež humusa.

Na ta sloj se doda živica (ki se ohranjena pri graditvi objekta) in manjkajoča kvalitetna rodovitna zemlja. Sledi obdelava tal, grobo planiranje, gnojenje z organskimi gnojili, freziranje in fino planiranje. Le organska masa, oplemenitena s talnimi mikroorganizmi (star hlevski gnoj, kompost, kompostu podobna organska gnojila) bo pomagala v tleh vzpostaviti trajno strukturo, kar pomeni rahlost in sposobnost zadrževanja in oddajanja rastlinskih hranil, vode in zraka. Vse to namreč rastline za svoj razvoj nujno potrebujejo. Tako zrahljana in z organskimi dodatki oplemenitena zemlja se bo po svojih lastnostih približala vrtni zemlji, v kateri večina rastlin dobro uspeva.

Vzdrževanje novega nasada

Sadno drevje:

Pri izbranih odpornih sadnih sadikah bo potrebno letno obrezovanje, okopavanje okoli debla in občasno škropljenje proti ušem.

Cvetoče grmovnice :

- *Chaenomeles japonica* 'Vesuvius'

Ker bo rasla na strmi klančini, se ne obrezuje.

- *Deutzia kalmiflora*, *Spirea nipponica* 'Snowmond' in *Ribez sanguineum*

Pri odraslih rastlinah se navadno odstranjujejo najstarejši poganjki. Za pomladitev grma se vsako leto odstrani po tretjino poganjkov, pri čemer začnemo z najstarejšimi. Tako se bodo tekom treh let obrezovanja, grmi povsem pomladili.

- *Viburnum plicatum* 'Shasta'

Se ne obrezuje.

- *Cotoneaster dammeri* 'Coral beauty' in *Jasminum nudiflorum*

Gre za plazeče grmovnice z vejami, ki poženejo do 100 cm in več. Sadike se posadijo ob mreži in se vejam, tekom rasti, ročno pomaga, da se vrastejo v mrežo ograje. Obrezovati jih je treba tako, da skupaj z mrežo tvorijo celoto.

- *Lonicera nitida* 'My Grün' in *Simphoricarpus chenaulti* 'Hancock'

Ko se sadike razrastejo se nasad vzdržuje striženjem s škarpami za živo mejo. Grmi se s striženjem oblikujejo v nepravilne valovito zaobljene gmote, ki se tekom rasti spojijo v enotno povezano valovito formo.

Trajnice in okrasne trave:

Izbrali smo vrste nezahtevne za vzdrževanje.

- *Carex morrowi* 'Variegata'

Je zimzelena rastlina, ki se jo poreže spomladi

- *Helleborus* - teloh

Telohi so rastline, ki v začetku rastejo počasi, potem se močno razrastejo. Poškodovane liste se v jeseni odreže.

- *Hemerocallis Stella d'Oro*

Po cvetenju je potrebno porezati liste, na kar bo odgnala nove, sveže liste.